

**Titular:** L'ús irregular d'opioides també existeix en les cures pal·liatives.

**Referència bibliogràfica:** [Frequency of and Factors Associated With Nonmedical Opioid Use Behavior Among Patients With Cancer Receiving Opioids for Cancer Pain](#). Yennurajalingam S, et al. JAMA Oncol. 2021. PMID: 33410866

**Data de publicació:** gener 2021

**Rellevància a criteri del revisor:** L'ús dels opioides de manera irregular o diferent del què ha pautat el metge és un problema real, probablement creixent, que suposa un mal control del símptoma pel pacient i un repte complex per a l'equip assistencial. Segurament alguns casos ens passen desapercebuts si no fem un registre sistemàtic que faci visible condicions concretes en la valoració integral del pacient. L'equip del MD Anderson Cancer Center proposa en aquesta publicació com incorporar en la valoració integral del pacient el registre de comportaments de risc o una eina d'avaluació del risc de fer mal ús dels opioides receptats. Així mateix, presenten que en la seva mostra (1554 pacients amb càncer atesos per l'equip de cures pal·liatives durant més de tres mesos) un 19% dels pacients tenien algun comportament d'ús irregular de l'opioide, els més freqüents dels quals eren visites/trucades fora d'hora per demanar més receptes o augment de dosis per pròpia decisió del malalt.

**Revisor:** Verònica Romaní, metge ufiss de cures pal·liatives, Fundació Assistencial Mútua Terrassa.